

**ALGIS-SPRAY, Huidspray, oplossing****Terpentijnolie 59,0 mg/g – Kamfer (racemisch) 59,0 mg/g –****Menthol 35,4 mg/g****Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.**

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrijf krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter:**

1. Waarvoor wordt Algis-spray gebruikt?
2. Wanneer mag u Algis-spray niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Algis-spray?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Algis-spray?
6. Aanvullende informatie

**1. WAARVOOR WORDT ALGIS-SPRAY GEBRUIKT?**

Algis-spray is een huidspray. Het is een oplossing voor gebruik op de huid tegen pijnlijke spier- en gewrichtsaandoeningen.

Algis-spray is aangewezen bij de symptomatische behandeling van spier- en gewrichtspijn.

**2. WANNEER MAG U ALGIS-SPRAY NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?****Wanneer mag u Algis-spray niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Niet aanbrengen op de slijmvliezen.
- In geval van een aandoening en/of een infectie van de huid: open wonden, blaasjes, blaren, brandwonden.
- Bij kinderen jonger dan 10 jaar.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Algis-spray?**

- Vermijd contact met ogen en slijmvliezen.
- Het product is licht ontvlambaar en mag niet verstooven worden in de nabijheid of in de richting van een vlam of van een gloeiend voorwerp.
- Kinderen (vooral zuigelingen) zijn bijzonder gevoelig voor sommige bestanddelen van Algis-spray. Het gebruik van Algis-spray op de huid kan aanleiding geven tot daling van de bloeddruk, een blauwe kleur van de huid en stuipen. Gebruik Algis-spray niet bij kinderen jonger dan 10 jaar.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Algis-spray nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrijf voor nodig heeft.

**Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

**Zwangerschap en borstvoeding**

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Bij zwangerschap en borstvoeding wordt het gebruik van Algis-spray afgeraden.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

**Stoffen in Algis-spray waarmee u rekening moet houden**

Algis-spray bevat benzoëtinctuur. Deze stof kan licht irriterend zijn voor de huid, de ogen en slijmvliezen.

**3. HOE GEBRUIKT U ALGIS-SPRAY?**

Gebruik Algis-spray altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

2 à 3 maal per dag in functie van de intensiteit van de pijn.

Bij een extra belasting van de spieren: vóór en na de inspanning.

Plaats de spray op een afstand van ongeveer 20 cm van de huid en verstuif gedurende enkele seconden over het te behandelen lichaamsdeel. Inwrijven of masseren is niet nodig.

De spray mag in elk positie gebruikt worden.

**Heeft u te veel van Algis-spray gebruikt?**

Wanneer u teveel Algis-spray zou hebben gebruikt of Algis-spray zou hebben ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Kinderen, en vooral zuigelingen, kunnen symptomen van overdosering vertonen na lokale toediening.

**- Symptomen:**

Een lichte overdosering kan soms voorkomen en wordt gekenmerkt door hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken. Ernstige overdoseringen met kamfer, menthol of terpentijnolie kunnen soms voorkomen bij kinderen en zuigelingen, zelfs bij uitwendig gebruik.

Zeer ernstige overdosering kan leiden tot ernstige vergiftiging (intoxicatie). De symptomen van intoxicatie zijn: shock, blauwe kleur van de huid, plotselinge daling van de bloeddruk, verhoging van de lichaamstemperatuur, stuipen, coma.

**- Behandeling:**

Bij lichte overdosering: stop de behandeling. Dit is doorgaans voldoende om de symptomen te doen verdwijnen.

Bij ernstige overdosering: verwittig onmiddellijk een dokter.

**- Raadgeving aan de geneesheer voor behandeling:**

In geval van ernstige intoxicatie dient een symptomatische behandeling te worden ingesteld teneinde de circulatoire en respiratoire functies te herstellen, eventueel in combinatie met hemoperfusie op actieve kool of een wisseltransfusie. De convulsies kunnen gecontroleerd worden door intraveneuze inspuiting van diazepam of een barbituraat met snelle werking.

**Bent u vergeten Algis-spray te gebruiken?**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

**Als u stopt met het gebruik van Algis-spray**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

**4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.**

Zoals elk geneesmiddel kan Algis-spray bijwerkingen hebben, al krijgt niet ieder een daarmee te maken.

- Eventuele lokale allergische reacties (uitslag, jeuk, huidontsteking). Stop dan de behandeling.
- Huidirritatie.

- Mogelijkheid van plaatselijke roodverkleuring van de huid, dit is een normale reactie.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**5. HOE BEWAART U ALGIS-SPRAY?**

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Elke verhitting vermijden, verwijderen van vuur, warmtebronnen en zonlicht. De spuitbus staat onder druk en mag niet doorboord worden of in het vuur geworpen worden, zelfs niet als ze leeg is.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

**6. AANVULLENDE INFORMATIE.****Welke stoffen zitten er in Algis-spray?**

- De werkzame stoffen in Algis-spray zijn terpentijnolie 59,0 mg/g, kamfer (racemisch) 59,0 mg/g en menthol 35,4 mg/g.
- De andere stoffen in Algis-spray zijn benzoëtinctuur, benzylalcohol, methylsalicylaat, vitamine E nicotinaat en ethanol 96 %. Drijfgas: Stikstof.

**Hoe ziet Algis-spray eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Aluminium spuitbus met 150 ml oplossing.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.**

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE244876

Vrije aflevering.

**Deze bijsluiter is goedgekeurd in 09/2014.****ALGIS-SPRAY, Huidspray, oplossing****Huile de térébenthine 59,0 mg/g – Camphre (racémique) 59,0 mg/g –****Menthol 35,4 mg/g****Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours utiliser Algis-spray avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.



- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

**Dans cette notice:**

1. Qu'est-ce que Algis-spray et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Algis-spray ?
3. Comment utiliser Algis-spray ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Algis-spray ?
6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE ALGIS-SPRAY ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Algis-spray est une solution pour pulvérisation cutanée. C'est une solution pour une utilisation sur la peau en cas d'affections douloureuses musculaires et articulaires.

Algis-spray est recommandé dans le traitement symptomatique des douleurs musculaires et articulaires.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALGIS-SPRAY ?****N'utilisez jamais Algis-spray**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'huile de térébenthine, au camphre ou au menthol ou à l'un des autres composants contenus dans Algis-spray.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses.
- En cas de lésion et/ou d'infection de la peau: blessures ouvertes, vésicules, ampoules, brûlures.
- Chez les enfants de moins de 10 ans.

**Faites attention avec Algis-spray**

- Evitez le contact avec les yeux et les muqueuses.
- Le produit est légèrement inflammable et ne peut pas être pulvérisé à proximité ou en direction d'une flamme ou d'un objet incandescent.
- Les enfants (surtout les nourrissons) sont très sensibles pour certains constituants d'Algis-spray. L'utilisation d'Algis-spray sur la peau peut provoquer une diminution de la tension, une coloration bleue de la peau ou des convulsions. N'utilisez pas Algis-spray chez les enfants de moins de 10 ans.
- Si vous utilisez d'autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Utilisation d'autres médicaments».

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

**Utilisation d'autres médicaments**

Si vous utilisez ou avez utilisé récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Aliments et boissons**

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

**Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser tout médicament.

Il est déconseillé d'utiliser Algis-spray pendant la grossesse et l'allaitement.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

**Informations importantes concernant certains composants d'Algis-spray**

Algis-spray contient de la benjoin teinture. Cette substance peut provoquer de légères irritations de la peau, des yeux et des muqueuses.

**3. COMMENT UTILISER ALGIS-SPRAY?**

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est:

2 à 3 fois par jour en fonction de l'intensité de la douleur.

Si les muscles sont fortement sollicités: appliquer avant et après l'effort.

Placez le spray à environ 20 cm de la peau et pulvérisez pendant quelques secondes sur le membre à traiter. Il n'est pas nécessaire de frictionner ou de masser.

Le spray peut être placé dans toutes les positions.

**Si vous avez utilisé plus d'Algis-spray que vous n'auriez dû**

Si vous avez utilisé trop d'Algis-spray, ou si vous avez pris d'Algis-spray, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Anti-Poison (070/245.245).

Les enfants, surtout les nourrissons, peuvent présenter des symptômes de surdosage après administration locale.

**- Symptômes:**

Un léger surdosage peut parfois se manifester et se caractérise par des maux de tête, des étourdissements, des nausées et des vomissements. D'importants surdosages au camphre, au menthol ou à l'huile de térébenthine peuvent parfois se manifester chez les enfants et les nourrissons, même en cas d'usage externe.

Un surdosage important peut entraîner un empoisonnement (intoxication) grave. Les symptômes d'intoxication sont: choc, coloration bleue de la peau, diminution soudaine de la tension, hausse de la température corporelle, convulsions, coma.

**- Traitement:**

En cas de léger surdosage: interrompez le traitement. Ça suffit pour faire disparaître les symptômes.

En cas de surdosage important: avertissez immédiatement un médecin.

**- Conseils au médecin pour le traitement:**

En cas d'intoxication sévère, il convient d'instaurer un traitement symptomatique visant à rétablir les fonctions circulatoires et respiratoires, éventuellement en association avec une hémostérilisation au charbon actif ou une exsanguino-transfusion. Les convulsions peuvent être contrôlées par injection intraveineuse de diazépam ou d'un barbiturate à action rapide.

**Si vous oubliez d'utiliser Algis-spray**

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

## ALGIS-SPRAY, Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung

Terpentinöl 59,0 mg/g – Kampfer (racemischer) 59,0 mg/g –

Menthol 35,4 mg/g

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Algis-Spray jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.



- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Algis-Spray und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Algis-Spray beachten?
3. Wie ist Algis-Spray anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Algis-Spray aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST ALGIS-SPRAY UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Algis-Spray ist ein Spray zur Anwendung auf der Haut. Es ist eine Lösung zur Anwendung auf der Haut gegen schmerzhafte Muskel- und Gelenkserkrankungen. Algis-Spray ist angezeigt bei Symptomatische Behandlung von Muskel- und Gelenkentzündungen.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ALGIS-SPRAY BEACHTEN?

**Algis-Spray darf nicht angewendet werden,**

- Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Terpentinöl, Kampfer, Menthol oder einen der sonstigen Bestandteile von Algis-Spray sind.
- Nicht auf Schleimhäuten anwenden.
- Im Falle einer Verletzung und/oder Entzündung der Haut: offene Wunden, Bläschen, Blasen, Brandwunden.
- Bei Kindern unter 10 Jahren.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Algis-Spray ist erforderlich,**

- Vermeiden Sie Kontakt mit Augen und Schleimhäuten.
- Das Produkt ist leicht entzündlich und darf nicht in der Nähe oder in Richtung einer Flamme oder eines glühenden Gegenstandes zerstäubt werden.
- Kinder (insbesondere Säuglinge) sind überempfindlich gegenüber bestimmten Bestandteilen von Algis-Spray. Die Anwendung von Algis-Spray auf der Haut kann zu einer Verringerung des Blutdrucks führen, zu einer Blaufärbung der Haut oder zu Konvulsionen. Algis-Spray darf nicht angewendet werden bei Kindern unter 10 Jahren.
- Wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden. Bitte lesen Sie auch die Rubrik: „Bei Anwendung von Algis-Spray mit anderen Arzneimitteln“.

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn einer der obigen Warnungen auf Sie zutrifft oder dies in der Vergangenheit der Fall war.

**Bei Anwendung von Algis-Spray mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Anwendung von Algis-Spray zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

In der Schwangerschaft und Stillzeit wird die Anwendung von Algis-Spray abgeraten.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Algis-Spray**

Algis-Spray enthält Benzoetinktur. Dieser Stoff kann für die Haut, die Augen und die Schleimhäute leicht irritierend sein.

### 3. WIE IST ALGIS-SPRAY ANZUWENDEN?

Wenden Sie Algis-Spray immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

2 - 3 Mal pro Tag je nach der Heftigkeit der Schmerzen.

Bei zusätzlicher Belastung der Muskeln: vor und nach der Anstrengung.

Das Spray auf ungefähr 20 cm Abstand von der Haut auftragen und während einiger Sekunden über dem zu behandelnden Körperteil zerstäuben. Einreiben oder Massieren ist nicht erforderlich.

Das Spray darf in gleich welcher Position eingesetzt werden.

**Wenn Sie eine größere Menge von Algis-Spray angewendet haben, als Sie sollten**

Falls Sie zu viel Algis-Spray angewendet haben sollten oder Algis-Spray eingenommen haben würde, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Kinder, und vor allem Säuglinge, können nach lokaler Verabreichung Symptome einer Überdosierung aufweisen.

- **Symptome:**

Eine leichte Überdosis kann manchmal vorkommen und äußert sich durch Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen. Ernsthafte Überdosis von Kampfer, Menthol oder Terpentinöl können manchmal bei Kindern und Säuglingen auftreten, sogar bei externer Anwendung.

Eine sehr schwere Überdosierung kann zu einer schweren Vergiftung (Intoxikation) führen. Die Symptome Vergiftung sind: Schock, Blaufärbung der Haut, plötzlicher Abfall des Blutdrucks, Anstieg der Körpertemperatur, Konvulsionen, Koma.

- **Behandlung:**

Bei leichter Überdosis: die Behandlung einstellen. Dies ist normalerweise ausreichend, um die Symptome abklingen zu lassen.

Bei schwerwiegender Überdosis: Verständigen Sie unverzüglich einen Arzt.

- **Unterrichtung des Arztes vor der Behandlung:**

Im Falle schwerer Vergiftung muss eine Behandlung der Symptome eingeleitet werden, um den Kreislauf und die Atmungsfunktion wiederherzustellen, gegebenenfalls bei einer gleichzeitigen Hämoperfusion mit Aktivkohle oder einem Blutwechsel. Die Konvulsionen lassen sich durch eine intravenöse Injektion von Diazepam oder eines schnell wirkenden Barbiturates einstellen.

**Wenn Sie die Anwendung von Algis-Spray vergessen haben**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wenn Sie die Anwendung von Algis-Spray abbrechen**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Algis-Spray Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Eventuelle lokale allergische Reaktionen (Ausschlag, Jucken, Entzündung der Haut). Stellen Sie die Behandlung in diesem Fall ein.

- Hautreizungen.

- Gegebenenfalls eine örtliche Rötung der Haut. Dies ist eine normale Reaktion. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### 5. WIE IST ALGIS-SPRAY AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Erhitzung vermeiden, Feuer, Hitzequellen und Sonnenlicht ebenfalls fernhalten. Die Spraydose steht unter Druck und darf weder durchbohrt noch ins Feuer geworfen werden, auch nicht wenn sie leer ist.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Packung nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Die ersten beiden Ziffern geben den Monat, die folgenden zwei oder vier Ziffern das Jahr an. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN.

**Was Algis-Spray enthält**

- Die Wirkstoffe sind Terpentinöl 59,0 mg/g, Kampfer (racemischer) 59 mg/g und Menthol 35,4 mg/g.

- Die sonstigen Bestandteile sind Benzoetinktur, Benzylalkohol, Methylsalicylat, Vitamin E Nikotinat und Ethanol 96%. Treibgas: Stickstoff.

**Wie Algis-Spray aussieht und Inhalt der Packung**

Aluminium Druckbehältnis mit 150 ml Lösung.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem

Zulassungsnummer: BE244876

Freie Abgabe.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 09/2014.

## ALGIS-SPRAY, cutaneous spray, solution

Turpentine oil 59,0 mg/g – Camphor (racemic) 59,0 mg/g –

Menthol 35,4 mg/g

**Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you.**

This medicine is available without prescription. However, you still need to use Algis-spray carefully to get the best results from it.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- You must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

**In this leaflet:**

1. What Algis-spray is and what it is used for.
2. Before you use Algis-spray.
3. How to use Algis-spray.
4. Possible side effects.
5. How to store Algis-spray.
6. Further information.

### 1. WHAT ALGIS-SPRAY IS AND WHAT IT IS USED FOR.

Algis-spray is a cutaneous spray. It is a solution for use on the skin in case of painful disorders of muscles and joints.

Algis-spray is recommended for the symptomatic treatment of painful muscles and joints.

### 2. BEFORE YOU USE ALGIS-SPRAY.

**Do not use Algis-spray**

- If you are allergic (hypersensitive) to turpentine oil, camphor, menthol or any of the other ingredients of Algis-spray.
- Do not apply to the mucous membranes.
- In case of a skin disorder and/or infection: open wounds, vesicles, blisters or burns.
- On children younger than 10 years old.

**Take special care with Algis-spray**

- Avoid contact with the eyes and mucous membranes.
- The product is highly flammable and cannot be sprayed in the vicinity or direction of a flame or incandescent object.
- Children (especially infants) are very sensitive towards some components of Algis-spray. The application of Algis-spray on the skin can cause a decreased blood pressure, a blue discolouration of the skin and convulsions. Do not use Algis-spray on children younger than 10 years old.
- If you are using other medication. Please also read the section "Using other medicines".

Consult your doctor if one of the above warnings applies to you, or if this has been the case in the past.

**Using other medicines**

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

**Using Algis-spray with food and drink**

No special precautions needed.

**Pregnancy and breast-feeding.**

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

The use of Algis-spray during pregnancy or breast-feeding is not recommended.

**Driving and using machines**

No special precautions needed.

**Important information about some of the ingredients of Algis-spray**

Algis-spray contains tincture of benzoin. This substance can be mildly irritant to the skin, eyes and mucous membranes.

### 3. HOW TO USE ALGIS-SPRAY.

Always use Algis-spray exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The usual dose is:

Apply 2 to 3 times daily, depending on the intensity of the pain.

In case of extreme muscular effort: apply before and after the effort.

Hold the spray can at a distance of approximately 20 cm from the skin and spray for several seconds to the part of the body to be treated. It is not necessary to rub in or massage.

The spray can may be used in any position.

**If you use more Algis-spray than you should**

If you have used too much Algis-spray or if you have ingested Algis-spray, immediately contact your doctor, your pharmacist or the Anti-Poison centre (070/245.245).

Children, particularly infants, can show symptoms of an overdose after local application.

- **Symptoms:**

A slight overdose can sometimes occur and is characterised by headache, dizziness, nausea and vomiting. Severe overdoses with camphor, menthol or turpentine oil can sometimes occur in children and infants, even in case of external use.

A very severe overdose can lead to a severe poisoning (intoxication). The symptoms of intoxication are: shock, blue discolouration of the skin, an abrupt decrease in blood pressure, elevated body temperature, convulsions, coma.

- **Treatment:**

In case of a slight overdose: stop the treatment. This is usually sufficient to make the symptoms disappear.

In case of a severe overdose: immediately contact a doctor.

- **Advice to the treating physician:**

In case of a severe intoxication, a symptomatic treatment must be initiated in order to restore the circulatory and respiratory functions, possibly in combination with hemoperfusion using activated carbon or a blood exchange transfusion. Convulsions can be controlled by intravenous injection of diazepam or a fast-acting barbiturate.

**If you forget to use Algis-spray**

No special precautions needed.

**If you stop using Algis-spray**