

TOULARYNX THYM, siroop

Thymus vulgaris L. vloeibaar extract [1:2-3], extractiesolvent ammonia 10% (m/m) : glycerol 85% (m/m) : ethanol 90% (v/v) : water (1:20:70:109)

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Toularynx thym en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Toularynx thym niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Toularynx thym in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Toularynx thym?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAT IS TOULARYNX THYM EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Toularynx thym is een traditioneel kruidengeneesmiddel dat gebruikt wordt als middel om het ophoesten van slijm te vergemakkelijken (expectorans) bij productieve hoest geassocieerd met verkoudheid.

Het is een traditioneel kruidengeneesmiddel dat uitsluitend op basis van reeds lang gekend gebruik toegepast wordt bij de genoemde indicaties.

2. WANNEER MAG U TOULARYNX THYM NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Toularynx thym niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U bent allergisch voor planten die behoren tot de lipbloemigen (Lamiaceae-familie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Toularynx thym?

Neem contact op met uw arts of apotheker indien één van dit middel inneemt.

- Het gebruik bij kinderen onder 2 jaar wordt niet aangeraden omdat medisch advies moet worden ingewonnen.
- Raadpleeg uw arts indien kortademigheid (dyspneu), koorts of etterige slijmen (purulent sputum) optreedt.
- Raadpleeg uw arts indien de symptomen tijdens het gebruik van dit geneesmiddel erger worden.
- Toularynx thym bevat alcohol en maltitol. Gelieve ook de rubriek “Toularynx thym bevat alcohol en maltitol” te lezen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen

Het gebruik bij kinderen onder 2 jaar wordt niet aangeraden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Toularynx thym nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Voorzichtigheid is geboden indien u behandeld wordt met disulfiram of metronidazol door de aanwezigheid van alcohol in Toularynx thym.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen die alcohol bevatten, moet worden vermeden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Er zijn geen wisselwerkingen gekend.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Toularynx thym bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek “Toularynx thym bevat alcohol en maltitol” te lezen wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Zwangerschap:

Het gebruik van Toularynx thym tijdens de zwangerschap wordt niet aangeraden.

Borstvoeding:

Het gebruik van Toularynx thym tijdens de periode van borstvoeding wordt niet aangeraden.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen vruchtbaarheidsgegevens beschikbaar.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies gekend over het effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hou er echter rekening mee dat Toularynx thym alcohol bevat. Gelieve ook de rubriek “Toularynx thym bevat alcohol en maltitol” te lezen.

Toularynx thym bevat alcohol en maltitol

Het vloeibaar tijn extract in dit geneesmiddel bevat alcohol (ethanol), resulterend in 2,2 vol % in de siroop, d.w.z. max. 260 mg per dosis (15 ml), hetgeen overeenkomt met 6,6 ml bier of 2,8 ml wijn per dosis.

Dit is schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Dit geneesmiddel bevat vloeibare maltitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Maltitol kan een licht laxerend effect hebben. Calorische waarde: 2,3 kcal/g maltitol.

3. HOE NEEMT U TOULARYNX THYM IN?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Toedieningsweg: oraal gebruik.

Deze siroop is suikervrij en kan aldus zonder problemen gebruikt worden door diabetici. De verpakking bevat een maatbekertje dat tot 30 ml kan afmeten. De fles wordt afgesloten door een kindveilige sluiting die als volgt moet geopend worden: duw de dop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in draait (zie figuur).



De aanbevolen dosering is:

Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen: 15 ml, 4 maal per dag.

Kinderen van 4 tot 12 jaar: 10 ml, 4 maal per dag.

Kinderen van 2 tot 4 jaar: 5 ml, 4 maal per dag.

Het interval tussen twee innamen moet minstens 4 uur bedragen.

Het gebruik bij kinderen onder 2 jaar wordt niet aangeraden.

Raadpleeg uw arts indien de symptomen langer dan 7 dagen aanhouden.

Heeft u te veel van Toularynx thym ingenomen?

Wanneer u te veel van Toularynx thym heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Er zijn geen gevallen van overdosering gekend.

Bent u vergeten Toularynx thym in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Toularynx thym

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook Toularynx thym bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- Maagklachten

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw art of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/ 40

B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U TOULARYNX THYM?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Gebruik Toularynx thym niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket/de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening is Toularynx thym 6 maanden houdbaar.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Toularynx thym?

- De werkzame stof in Toularynx thym is: Thymus vulgaris L. vloeibaar extract [1:2-3], extractiesolvent ammonia 10% (m/m) : glycerol 85% (m/m) : ethanol 90% (v/v) : water (1:20:70:109) 6,5 g/100 ml.
- De andere stoffen in Toularynx thym zijn: citroenzuur, watervrij - natriumbenzoaat - kaliumsorbaat - natriumcitraat dihydraat - vloeibare maltitol - gezuiverd water

Hoe ziet Toularynx thym eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Glazen fles van 125 ml of 180 ml met kindveilige sluiting uit polypropyleen of polypropyleen/polyethyleen met een polyethyleen inlage, geleverd met maatbekertje van 30 ml.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

Registratienummer: BE-TU464622

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 04/2020.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2020.

TOULARYNX THYM, sirop

Thymus vulgaris L. extrait fluide [1:2-3], agent d'extraction ammoniac 10% (m/m) : glycérol 85% (m/m) : éthanol 90% (v/v) : eau (1:20:70:109)

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que Toularynx thym et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Toularynx thym?
3. Comment prendre Toularynx thym?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Toularynx thym?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TOULARYNX THYM ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE?

Toularynx thym est un médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour faciliter l'expectoration des glaires (expectorant) en cas de toux productive associée au rhume. Ce médicament traditionnel à base de plantes est utilisé dans les indications énoncées, exclusivement basé sur un usage connu.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TOULARYNX THYM?

Ne prenez jamais Toularynx thym

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans Toularynx thym mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux plantes de la famille des labiacées (famille des Lamiaceae).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Toularynx thym.

- L'utilisation chez les enfants de moins de 2 ans n'est pas recommandée, car il est référable de consulter un médecin.
- Consultez votre médecin en cas d'essoufflement (dyspnée), de fièvre ou de glaires purulentes (sputum purulent).
- Consultez votre médecin si les symptômes s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament.
- Toularynx thym contient de l'alcool et du maltitol. Veuillez également lire la rubrique « Toularynx thym contient de l'alcool et du maltitol ».
- Si vous prenez d'autres médicaments, veuillez également lire la rubrique « Autres médicaments et Toularynx thym ».

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Enfants

L'utilisation chez les enfants de moins de 2 ans n'est pas recommandée.

Autres médicaments et Toularynx thym

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

La prudence est de mise si vous prenez du disulfiram ou du métronidazol, en raison de la présence d'alcool dans Toularynx thym.

L'utilisation simultanée de différents médicaments contenant de l'éthanol doit être évitée.

Toularynx thym avec des aliments et boissons

Aucune interaction connue.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Toularynx thym contient de l'alcool. Veuillez également lire la rubrique « Toularynx thym contient de l'alcool et du maltitol » lorsque vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Grossesse:

L'utilisation de Toularynx thym est déconseillée pendant la grossesse.

Allaitement:

L'utilisation de Toularynx thym est déconseillée pendant l'allaitement.

Fertilité:

Aucune donnée n'est disponible sur la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune étude n'est connue quant à l'effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines. Il faut tenir compte du fait que Toularynx thym contient de l'alcool. Veuillez également lire la rubrique « Toularynx thym contient de l'alcool et du maltitol ».

Toularynx thym contient de l'alcool et du maltitol

Ce médicament contient 2,2% de vol d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu' à 260 mg par dose (15 ml), ce qui équivaut à 6,6ml de bière ou 2,8ml de vin par dose. L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

Ce médicament contient du maltitol liquide. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. Le maltitol peut présenter un effet légèrement laxatif. Valeur calorique: 2,3 kcal/g maltitol.

3. COMMENT PRENDRE TOULARYNX THYM?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Voie d'administration: voie orale.

Ce sirop ne contient pas de sucre et peut donc être pris sans problème par les personnes diabétiques.

L'étui contient un godet doseur gradué qui peut mesurer jusqu'à 30 ml. Le flacon est fermé par une fermeture de sécurité enfant qui doit être ouverte comme suit: poussez sur le bouchon à visser tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir figure).



La dose recommandée est de:

Enfants de plus de 12 ans et adultes: 15 ml, 4 fois par jour.

Enfants de 4 à 12 ans: 10 ml, 4 fois par jour.

Enfants de 2 à 4 ans: 5 ml, 4 fois par jour.

Veillez à respecter un intervalle d'au moins 4 heures entre chaque prise.

L'utilisation chez les enfants de moins de 2 ans n'est pas recommandée.

Si les symptômes persistent plus de 7 jours, il est recommandé de consulter un médecin.

Si vous avez pris plus de Toularynx thym que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Toularynx dextromethorphan, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Aucun cas de surdosage connu.

Si vous oubliez de prendre Toularynx thym

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Toularynx thym

Aucune précaution particulière ne doit être observée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Toularynx thym peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables possibles:

- Maux d'estomac.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration:

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/ 40

B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER TOULARYNX THYM?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Pas de précautions particulières de conservation. N'utilisez pas Toularynx thym après la date de péremption mentionnée sur le flacon/l'étui après « EXP ». Les deux premiers chiffres représentent le mois, les deux ou quatre derniers l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. Après ouverture Toularynx thym peut être conservé 6 mois.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Toularynx thym

- La substance active est Thymus vulgaris L. extrait fluide [1:2-3], agent d'extraction ammoniac 10% (m/m) : glycérol 85% (m/m) : éthanol 90% (v/v) : eau (1:20:70:109) 6,5 g pour 100ml de sirop.
- Les autres composants sont acide citrique anhydre, benzoate de sodium, sorbate de potassium, citrate de sodium dihydraté, maltitol liquide, eau purifiée.

Aspect de Toularynx thym et contenu de l'emballage extérieur

Flacon en verre de 125 ml ou 180 ml avec une fermeture de sécurité enfant en polypropylène ou polypropylène/polyéthylène munie d'un disque d'étanchéité en polyéthylène, fourni avec un godet doseur gradué de 30 ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'enregistrement et fabricant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgique

Numéro d'enregistrement: BE-TU464622

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 04/2020.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 04/2020.

Qualiphar

Qualiphar

TOULARYNX THYM, syrup

Thymus vulgaris L. liquid extract [1:2-3], extraction solvent ammonia 10% (m/m) : glycerol 85% (m/m) : ethanol 90% (v/v) : water (1:20:70:109)

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have told you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
- You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 7 days.

What is in this leaflet

1. What Toularynx thym is and what it is used for.
2. What you need to know before you take Toularynx thym.
3. How to take Toularynx thym.
4. Possible side effects.
5. How to store Toularynx thym.
6. Contents of the pack and other information.

1. WHAT TOULARYNX THYM IS AND WHAT IT IS USED FOR.

Toularynx thym is a traditional herbal medicinal product used as an aid to facilitate coughing up phlegm (expectorant) in productive cough associated with cold. It is a traditional herbal medicinal product for use in the specified indication exclusively based upon long-standing use.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE TOULARYNX THYM.

Do not take toularnyx thym

- If you are allergic to the active substance or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).
- If you are allergic to plants belonging to the mint or deadnettle family (Lamiaceae family).

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Toularynx thym.

- The use in children younger than 2 years old is not recommended because medical advice should be sought.
- Consult your doctor when shortness of breath (dyspnoea), fever or phlegm containing pus (purulent sputum) occurs.
- Consult your doctor if the symptoms worsen during the use of this medicine.
- Toularynx thym contains alcohol and maltitol. Please also read the section "Toularynx thym contains alcohol and maltitol".
- If you are using other medicines. Please also read the section "Other medicines and Toularynx thym".

Consult your doctor if one of the above warnings applies to you, or if this has been the case in the past.

Children

The use in children under 2 years of age is not recommended.

Other medicines and Toularynx thym

Tell your doctor or pharmacist if you are using, have recently used or might use any other medicines.

You should be careful if you are treated with disulfiram or metronidazole because of the presence of alcohol in Toularynx thym.

The concomitant use of multiple medicines that contain ethanol should be avoided.

Toularynx thym with food and drink

There are no interactions known.

Pregnancy, breast-feeding and fertility

If you are pregnant or breast-feeding, think you might be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. Toularynx thym contains alcohol. Please also read the section "Toularynx thym contains alcohol and maltitol" if you are pregnant or breast-feeding.

Pregnancy:

The use of Toularynx thym during pregnancy is not recommended.

Breast-feeding:

The use of Toularynx thym during breast-feeding is not recommended.

Fertility:

No fertility data available.

Driving and using machines

There are no studies known on the effect on the ability to drive and use machines. Keep in mind however that Toularynx thym contains alcohol. Please also read the section "Toularynx thym contains alcohol and maltitol".

Toularynx thym contains alcohol and maltitol

The thyme liquid extract in this medicine contains alcohol (ethanol), resulting in 2,2 vol % in the syrup, i.e. up to 260 mg per dose (15 ml), equivalent to 6,6 ml beer or 2,8 ml wine per dose.

This is harmful for those suffering from alcoholism. To be taken into account in pregnant or breast-feeding women, children and high-risk groups such as patients with liver disease, or epilepsy.

This medicine contains liquid maltitol. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product. Calorific value: 2,3 kcal/g maltitol.

3. HOW TO TAKE TOULARYNX THYM.

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Method of administration: oral use.

This syrup is sugar-free and is therefore also suited for diabetics.

The packaging contains a cup that can measure up to 30 ml. The bottle is sealed with a child-resistant closure that should be opened as followed: push the closure down while turning counter-clockwise (see figure).



The recommended dose is:

Children from 12 years and adults: 15 ml, 4 times per day.

Children from 4 to 12 years: 10 ml, 4 times per day.

Children from 2 to 4 years: 5 ml, 4 times per day.

The interval between two intakes should be at least 4 hours.

The use in children under 2 years of age is not recommended.

Consult your doctor if your symptoms do not improve after 7 days.

If you take more Toularynx thym than you should

If you have taken too much Toularynx thym, immediately contact your doctor, your pharmacist or the Anti-Poison center (070/245.245).

No case of overdose has been reported.

If you forget to take Toularynx thym

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking Toularynx thym

There are no special precautions needed. If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS.

Like all medicines, Toularynx thym can cause side effects, although not everybody gets them.

The following side effects may occur:

- Stomach disorders

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via:

Federal agency for medicines and health products

Vigilance Division

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/ 40

B-1060 Brussels

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. HOW TO STORE TOULARYNX THYM.

Keep this medicine out of the sight and reach of children. This medicinal product does not require any special storage conditions. Do not use Toularynx thym after the expiry date which is stated on the label/the box after "EXP". The first two figures indicate the month, the following two or four figures the year. The expiry date refers to the last day of that month. Toularynx thym can be used until 6 months after opening.

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION.

What Toularynx thym contains

- The active substance is: Thymus vulgaris L. liquid extract [1:2-3], extraction solvent ammonia 10% (m/m) : glycerol 85% (m/m) : ethanol 90% (v/v) : water (1:20:70:109) 6,5 g/100 ml.
- The other ingredients are: citric acid, anhydrous - sodium benzoate - potassium sorbate - sodium citrate dihydrate - liquid maltitol - purified water

What Toularynx thym looks like and content of the pack

Glass bottle of 125 ml or 180 ml syrup with child-resistant closure of polypropylene or polypropylene/polyethylene with a polyethylene sealing disk, delivered with a cup of 30 ml.

Not all pack sizes may be marketed.

Registration Holder and Manufacturer

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgium

Registration Number: BE-TU464622

Freely available.

This leaflet was last revised in 04/2020.

This leaflet was last approved in 04/2020.

TOULARYNX THYM, Sirup

Thymus vulgaris L. Flüssigextrakt [1:2-3], Extraktionsmittel Ammoniaklösung 10% (m/m) : Glycerol 85% (m/m) : Ethanol 90% (v/v) : Wasser (1:20:70:109)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Toularynx thym und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Toularynx thym beachten?
3. Wie ist Toularynx thym einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Toularynx thym aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST TOULARYNX THYM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Toularynx thym ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das verwendet wird, um bei produktivem Husten in Verbindung mit einer Erkältung das Aushusten von Schleim zu vereinfachen (expectorans).

Es ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Basis von bereits lange bewährter Verwendung bei den genannten Indikationen eingesetzt wird.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON TOULARYNX THYM BEACHTEN? Toularynx thym darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Thymus vulgaris L. Flüssigextrakt oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Sie sind gegen Pflanzen allergisch, die zur Familie der Lippenblütler (Familie der Lamiaceae) gehören.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Toularynx thym einnehmen.

- Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren ist nicht empfohlen, da ärztlichen Rat eingeholt werden.
- Kontaktieren Sie einen Arzt, wenn Kurzatmigkeit (Dyspneu), Fieber oder eitriger Auswurf (Purulent sputum) auftreten.
- Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn sich die Symptome während der Anwendung dieses Arzneimittels verschlechtern.
- Toularynx thym enthält Alkohol und Maltitol. Bitte lesen Sie auch die Rubrik: „Toularynx thym enthält Alkohol und Maltitol“.
- Wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden. Bitte lesen Sie auch die Rubrik: „Einnahme von Toularynx thym zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn eine der obigen Warnungen auf Sie zutrifft oder dies in der Vergangenheit der Fall war.

Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren ist nicht empfohlen.

Einnahme von Toularynx thym zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwende, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Vorsicht ist geboten, wenn Sie mit Disulfiram oder Metronidazol behandelt werden, und zwar durch die Anwesenheit von Alkohol in Toularynx thym.

Die gleichzeitige Anwendung verschiedener Arzneimittel, die Alkohol enthalten, muss vermieden werden.

Einnahme von Toularynx thym zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Toularynx thym enthält Alkohol. Bitte lesen Sie auch die Rubrik: „Toularynx thym enthält Alkohol und Maltitol“ wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Schwangerschaft:

Die Anwendung von Toularynx thym während der Schwangerschaft wird nicht empfohlen.

Stillzeit:

Die Anwendung von Toularynx thym während der Stillzeit wird nicht empfohlen.

Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Es stehen keine Daten in Bezug auf Zeugungs-/Gebärfähigkeit zur Verfügung.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Studien über den Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Bedienung von Maschinen bekannt.

Berücksichtigen Sie jedoch, dass Toularynx thym Alkohol enthält. Bitte lesen Sie auch die Rubrik: „Toularynx thym enthält Alkohol und Maltitol“.

Toularynx thym enthält Alkohol und Maltitol

Das flüssige Thymianextrakt in diesem Arzneimittel enthält Alkohol (Ethanol), esultierend in 2,2 vol % im Sirup, d.h.bis zu 260 mg pro Dosis (15 ml), entsprechend 6,6 ml Bier oder 2,8 ml Wein pro Dosis.

Gesundheitliches Risiko für Patienten, die unter Alkoholismus leiden. Dies ist bei schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält flüssiges Maltitol. Bitte nehmen Sie Toularynx thym erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einen Zuckerunverträglichkeit leiden. Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Maltitol.

3. WIE IST TOULARYNX THYM EINZUNEHMEN?


Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein.

Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Art der Anwendung: Zum Einnehmen.

Dieser Sirup ist zuckerfrei und kann daher auch problemlos von Diabetikern ingenommen werden.

Die Verpackung enthält einen Messbecher, der bis zu 30 ml abmessen kann. Die Flasche ist mit einem kindersicheren Verschluss versehen, der wie folgt geöffnet werden muss: den Verschluss nach unten drücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung).



Die empfohlene Dosis beträgt:

Kinder über 12 Jahren und Erwachsene: 15 ml, 4 mal pro Tag.

Kinder von 4 bis 12 Jahren: 10 ml, 4 mal pro Tag.

Kinder von 2 bis 4 Jahren: 5 ml, 4 mal pro Tag.

Der Abstand zwischen zwei Einnahmen muss mindestens 4 Stunden betragen.

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren ist nicht empfohlen.

Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn die Symptome länger als 7 Tage andauern.

Wenn Sie eine größere Menge von Toularynx thym eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Toularynx thym haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Toularynx thym vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Toularynx thym abbrechen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die folgenden Nebenwirkungen können auftreten:

- Magenbeschwerden

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über
Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/40

B-1060 BRUSSEL

Website: www.fagg-afmps.be

E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST TOULARYNX THYM AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten beiden Zahlen nennen den Monat, die folgenden das Jahr. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Nach der Öffnung ist Toularynx thym 6 Monate lang haltbar.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Toularynx thym enthält

- Der Wirkstoff(e) ist: Thymus vulgaris L. Flüssigextrakt [1:2-3], Extraktionsmittel Ammoniaklösung 10% (m/m) : Glycerol 85% (m/m) : Ethanol 90% (v/v) : Wasser (1:20:70:109) 6,5 g/100 ml.

- Die sonstigen Bestandteile sind: Zitronensäure, wasserfrei – Natriumbenzoat – Kaliumsorbat – Natriumcitrat Dihydrat – flüssiges Maltitol – gereinigtes Wasser.

Wie Toularynx thym aussieht und Inhalt der Packung

Glasflasche von 125 ml oder 180 ml mit kindersicheren Verschluss aus Polypropylen oder Polypropylen/Polyethylen mit einer Polyethylen-Einlage, geliefert mit einem Messbecher von 30 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgium

Zulassungsnummer: BE-TU464622

Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 04/2020.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 04/2020.